

THÔNG BÁO

Về tình hình sâu bệnh trên lúa mùa dự báo trong thời gian tới

Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân!

Thực hiện thông báo số 14/TB-TTĐVNN ngày 23 tháng 8 năm 2021 của trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Hà. UBND xã Tân An thông báo về tình hình sâu bệnh trên lúa mùa dự báo trong thời gian tới với những nội dung sau:

Thời tiết trong thời gian qua trời nắng oi, xen kẽ một vài trận mưa rào và giông. Nhiệt độ trung bình 28 - 35⁰C, ẩm độ không khí trung bình 75 - 85%.

Trà mùa trung: đang làm đòng đến đòng già.

Trà mùa muộn: đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh.

TÌNH HÌNH CHUỘT PHÁ HẠI DIỄN BIẾN SÂU BỆNH

- Chuột: Gây hại rải rác các trà lúa. Tỷ lệ đánh bị hại trung bình 1,2%, nơi cao 2,6 %.
- Sâu cuốn lá nhỏ : Trưởng thành rải rác vũ hóa từ ngày 18/8 và vũ hóa rộ từ ngày 21/8 trở đi. Mật độ trưởng thành trung bình 1- 3 con/m², nơi cao 5 - 7 con/m².
- Sâu đục thân cú mèo: Gây hại cục bộ ở một số diện tích. Tỷ lệ đánh bị hại trung bình 1%, nơi cao 3,5%.
- Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Phát sinh lây lan gây hại các giống nhiễm như BC15, TBR225, ... Tỷ lệ lá bị nhiễm trung bình 3%, nơi cao 5%.
- Bệnh khô vằn: Lây lan gây hại các trà lúa. Tỷ lệ đánh bị nhiễm trung bình 8%, nơi cao 15%.

Ngoài ra còn rầy nâu, rầy xanh đuôi đen, ...

DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

- Chuột: tiếp tục gây hại rải rác các trà lúa.
- Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục lây lan gây hại lá và lá đòng các giống nhiễm làm ảnh hưởng lớn đến năng suất.
- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa rộ đến ngày 25/8 cục bộ có khu vực với mật độ cao, sâu non nở gây hại nặng lá và lá đòng các trà lúa đặc biệt trà lúa mùa trung, mùa muộn nếu không được phun trừ tốt.
- Sâu đục thân cú mèo: Tiếp tục gây hại cục bộ các trà lúa (gây bông bạc trà lúa mùa sớm, mùa trung, gây đánh héo trà lúa mùa muộn).
- Bệnh khô vằn: tiếp tục lây lan gây hại các trà lúa.
- Bệnh lem lép hạt: Nếu giai đoạn lúa trổ gặp mưa, bệnh phát sinh gây hại hạt làm giảm năng suất lúa.

Ngoài ra còn nhện gié, rầy nâu, rầy xanh đuôi đen, bệnh đạo ôn lá trên lúa nếp.

ĐỀ VIỆC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI LÚA TRONG THỜI GIAN TỚI ĐẠT HIỆU QUẢ UBND XÃ YÊU CẦU:

1. HTX DV NN chủ động điều tiết nước phù hợp để cây lúa làm đồng trổ bông, làm hạt được thuận lợi.

2. Các hộ dân chủ động đánh bắt chuột bảo vệ mùa màng bằng các biện pháp thủ công, như đặt bẫy, cạm, đặt mồi, quây ni nông; nghiêm cấm việc dùng điện lưới để đánh bắt chuột, nếu cá nhân nào cố tình đánh bắt chuột bằng điện, để xảy ra chết người thì cá nhân đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Đối với bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Bệnh này không có thuốc trừ đặc hiệu, chủ yếu áp dụng các biện pháp phòng để cây khỏe tăng sức đề kháng như đảm bảo đủ nước, bón phân cân đối NPK, bón sớm, bón tập trung, không bón lai rai, tăng cường bón kali, hạn chế bón thừa đạm ở giai đoạn bón đón đồng để phòng bệnh, theo dõi sát diễn biến của thời tiết nhất là giai đoạn lúa đứng cái, làm đồng đến trổ bông là giai đoạn miễn cảm của lúa với bệnh này; phun phòng trước và sau các đợt mưa giông, bảo đối với các giống nhiễm, ruộng thừa đạm, ruộng trũng, hầu,...bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Lobo 8WP, Starner 20WP, Ychatot 900SP, ...

4. Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Ưu tiên sử dụng một trong các loại thuốc như: Virtakô 40WG, hoặc DuPont™ Prevathon 5SC, Voliam Targo 063SC, ... (để hạn chế sâu đục thân). Phun cho toàn bộ diện tích từ ngày 28/8 đến 01/9/2021 (Sau phun 5 - 6 ngày kiểm tra lại nếu thấy mật độ sâu còn cao trên 20con/m² phải phun lại lần 2). Khi phun kết hợp với Anvil 5SC, Cavil 50SC, Validacin 5L, Javivil 50SC.....để trừ luôn bệnh khô vằn.

5. Đối với bệnh lem lép hạt: Dùng thuốc Tilsuper 300ND, Tiptop 250EC, Anvil 5SC, Athuoc top 480SC... phun phòng trừ.

6. Đối với nhện gié: Các hộ nông dân kiểm tra thấy có triệu chứng là các vết trích hút để lại nhiều sọc dài màu nâu tím bên ngoài bẹ lá (vết cạo gió, màu nâu hoặc nâu đen). Dùng thuốc Kinalux 25E, ... phun trừ.

7. Đối với sâu đục thân cú mèo: Các hộ kiểm tra đánh héo, thấy sâu non đục nát dảnh và nhiều sâu bên trong (khác đục thân hai chấm chỉ có một lỗ đục nhỏ). Dùng thuốc Sattrungdan 5GR để diệt trừ, lượng dùng 1 kg thuốc trộn đều với 4 kg cát khô hoặc đất bột rắc đều cho 1 sào, khi rắc ruộng phải có nước 3-5 cm và giữ nước ở ruộng 2 - 3 ngày.

(Chú ý: Khi lúa trổ phải phun thuốc vào chiều mát, phun xong gặp mưa phải phun lại).

Trên đây là thông báo của UBND xã Tân An về tình hình sâu bệnh trên lúa mùa dự báo trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí và toàn thể nhân dân thực hiện tốt nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Thiện

